

Leistungsverzeichnis für Zonulin im Stuhl

Bezeichnung:	Zonulin im Stuhl
Synonyme:	-
Zuordnung:	Stuhldiagnostik, Permeabilitätsmarker
Probenmaterial und Mindestmenge:	Stuhl; mind. bohngroße Stuhlprobe (befüllter Stuhllöffel) im Standard- Stuhlröhrchen
Abnahmehinweise:	Stuhlfänger verwenden; Anleitung zur Stuhlentnahme (auf Stuhlfänger aufgedruckt) beachten; Probenkontamination mit Wasser aus dem WC ist zu vermeiden.
Probenentnahmesets:	Versandset für „Stuhl“
Probentransport:	Postversand möglich, Probe wenn möglich direkt nach der Entnahme versenden.
Klinische Indikation:	V.a. Störung der intestinalen Schleimhautpermeabilität („Leaky Gut- Syndrom“). <u>Untersuchung sinnvoll auch bei:</u> Autoimmunerkrankungen, Diabetes mellitus (Typ I), Multiple Sklerose, Rheumatoide Arthritis, Zöliakie, Erhöhter Infektanfälligkeit, Allergien, Tumorerkrankungen.
Methode:	ELISA
Referenzbereich:	≤ 78 ng/ml Stuhl
Ansatztage:	1 x wöchentlich
Beurteilung:	≤ 78 ng/ml normal > 78 ng/ml erhöht
Informationsmaterial:	Arbeitskarte Zonulin
Begleitdokumente:	Ø
Bemerkungen:	In Verbindung mit der Untersuchung anderer Stuhlparameter ist zu beachten, dass sich die Mindestmenge an Probenmaterial ggf. erhöht.