

Leistungsverzeichnis für Diaminooxidase

Bezeichnung:	DAO (Diaminooxidase)
Synonyme:	-
Zuordnung:	Blutdiagnostik
Probenmaterial und Mindestmenge:	mind. 1 ml Serum oder Vollblut
Abnahmeanweisung:	Probeentnahmeset verwenden; Anleitung zur Probenentnahme beachten
Probenentnahmesets:	Versandset für „Serum - Blutdiagnostik“ Versandset (VS-HIS/DP) Histaminintoleranz (Stuhl und Blut)
Probentransport:	Postversand möglich, Probe wenn möglich direkt nach der Entnahme versenden. Maximale Transportdauer 2 Tage. Bitte beachten: Versandtage nur Mo – Do.
Klinische Indikation:	Häufige Kopfschmerzen oder Migräne, Schnupfen nach Genuss histaminhaltiger Nahrungsmittel, Gewebeödeme, Schwellung der Augenlider, Hautrötungen, Gliederschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden
Methode:	ELISA
Referenzbereich:	10,1 – 35,0 U/ml Histaminintoleranz unwahrscheinlich
Ansatztage:	1x wöchentlich
Beurteilung:	< 3,0 U/ml Histaminunverträglichkeit anzunehmen 3,0 – 10,0 U/ml Histaminunverträglichkeit wahrscheinlich 10,1 – 35,0 Histaminintoleranz unwahrscheinlich > 35,0 U/ml DAO erhöht, ggf. Hinweis auf Typ-I-Allergie
Informationsmaterial:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Patientenbroschüre „Histaminunverträglichkeit“ ▪ Broschüre „Histaminintoleranz – Ursache zahlreicher chronischer Beschwerden“ ▪ Einleger „Histaminintoleranz“ ▪ Arztkarte „Histaminintoleranz – Differentialdiagnostik“ ▪ Ernährungsempfehlung bei Histaminintoleranz
Begleitdokumente:	∅
Bemerkungen:	In Verbindung mit der Untersuchung anderer Blutparameter ist zu beachten, dass sich die Mindestmenge an Probenmaterial ggf. erhöht.