

Leistungsverzeichnis für Atopobium vaginae

Bezeichnung:	Atopobium vaginae
Synonyme:	∅
Zuordnung:	VaginalStatus/ UrogenitalStatus
Probenmaterial und Mindestmenge:	Vaginaler Abstrich/ Ejakulat
Abnahmehinweise/:	Versandset VaginalStatus
Probenentnahmesets:	Abnahmehinweise beachten, Anleitung liegt bei.
Probentransport:	Postversand möglich, Haltbarkeit im Nativpräparat: 2 Tage
Klinische Indikation:	Bakterielle Vaginose/ Dysbiose
Methode:	Quantitative PCR
Referenzbereiche:	10 ⁴ bis 10 ⁹ Zellen/ ml Vaginalflüssigkeit
Ansatztage:	Täglich
Beurteilung:	Erhöht, wenn > 10 ⁴ Zellen/ ml Vaginalflüssigkeit nachgewiesen wurden.
Ggf. Informationsmaterial:	Fachbroschüre: VaginalStatus Patientenbroschüre: Vaginale Probleme und ihre Vorbeugung
Ggf. Begleitdokumente:	∅
Bemerkungen:	Atopobium vaginae ist resistent gegenüber Metronidazol und dient in Zusammenhang mit G. vaginalis als Markerkeim einer bakteriellen Vaginose.